



# BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG



Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngành chăn nuôi. Đây là bệnh truyền nhiễm do vi-rút gây ra, khi lợn nhiễm bệnh, tỷ lệ chết có thể lên tới 100%.

## 1 Dấu hiệu nhận biết




Lợn sốt cao (40,5 - 42°C), bỏ ăn, lười vận động



Da tai, chân, ngực và bụng có màu đỏ, sau đó chuyển tím tái



Tiêu chảy, đôi khi có lẫn máu hoặc táo bón



Có thể lây lan nhanh trong đàn

## 2 Thực hiện 5 không để phòng, chống dịch

5  
không

Không giấu dịch, phát hiện lợn bệnh phải báo ngay chính quyền, thú y



KHÔNG MUA BÁN  
LỢN BỆNH



Không mua, bán lợn bệnh, lợn chết



Không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh




Không cho lợn ăn thức ăn thừa chưa nấu chín



Không vứt xác lợn bừa bãi ra môi trường


### 3 Thực hiện An toàn sinh học trong chăn nuôi




Cách ly chuồng nuôi với nhà ở và vật nuôi khác, có rào chắn, hồ sát trùng



Kiểm soát người và phương tiện ra vào trại, có bảo hộ riêng



Con giống phải sạch bệnh, nuôi cách ly giống mới ít nhất 2 tuần



Không nuôi lợn rừng, chó, mèo... trong khu vực chăn nuôi



Cung cấp nước sạch, thức ăn đảm bảo, không nhiễm mầm bệnh



Diệt chuột, ruồi, muỗi, côn trùng

### 4 Thực hiện vệ sinh, sát trùng hàng ngày



Làm sạch chuồng trại, dụng cụ, thiết bị



Phun thuốc sát trùng định kỳ



Xử lý chất thải bằng biogas, chôn hoặc đốt

### 5 Xử lý khi có dịch xảy ra



Báo ngay cho thú y, chính quyền địa phương



Tiêu hủy toàn bộ lợn bệnh theo hướng dẫn



Kê khai đầy đủ để được hỗ trợ nếu có chính sách